

솜털머리 타마린

Wata-boushi (면화 머리를 의미) Tamarin

학 명

Saguinus oedipus

분 류

Cebidae, Callitrichinae

분 포

남미 콜롬비아 북서부에있는 열대 우림과 강기슭 숲과 같은 산림.

식 성

주로 곤충, 작은 새의 알, 작은 도마뱀, 수액, 수지, 과일 등을 먹습니다.

형 태

체색은 뒷면이 검은 황토색이고 칙칙한 노란색이며 덜 투명한 얼룩 무늬가 있습니다. 복부는 흰색입니다. 머리와 목 뒤쪽에 솜처럼 길고 흰 털이있다. 머리 뒤에서 목까지 뭉치처럼 길고 흰 털이있다. "Cotton-headed"는이 길고 흰 머리카락에서 유래합니다.

생 태

2 ~ 9 명의 집단에 살고 있지만 한 집단의 암컷 만 번식 할 수 있으며 다른 집단 구성원은 출생 후 곧바로 영아 돌보기를 돕습니다. 임신 기간은 153 ~ 166 일이며 일반적으로 한배 당 2 명의 영아를 낳고 3 명 이상을 출산하는 경우는 드뭅니다. 과거에는 애완 동물로 거래를 위해 포획되어 개체수를 줄였으며 현재는 서식지 파괴로 개체수가 감소하고 있습니다. 이 종의 보호의 필요성은 전 세계적으로 강조되었으며 포로 번식 프로젝트는 많은 동물원에서 수행됩니다.

