

황새

Kouno-Tori

학명

Ciconia boyciana

분류

Ciconiiformes, Ciconiidae

분포

중국, 한반도, 아무르, 우수리, 일본 (재 도입)



식성

그들은 물고기, 곤충, 개구리와 같은 작은 동물을 잡아서 먹으며 천천히 얕은 강과 습지, 논을 걷는다.

형태

몸길이는 1 ~ 1.2m, 날개 길이는 2m에 가깝다.

길고 튼튼한 다리와 부리가 있습니다. 몸통은 거의 하얀 깃털로 덮여 있지만, 비행 깃과 같은 날개의 일부는 검은 색이고, 눈과 다리 주변의 피부는 빨갛다.

생태

습지에 접한 큰 나무 가지에 둥지를 틀고 2 ~ 6 개의 알을 낳습니다.

서식지 파괴와 살충제의 영향으로 일본에서 야생 개체수는 급격히 감소했습니다.

정부는 1956 년 특별 천연 기념물로 지정하여 보호를 시작했습니다. 그러나 일본인은 1971 년 야생에서 멸종되었습니다. 반면에 일부 황새는 동물원과 같은 포로에서 살아 남았고 1988 년에 성공적으로 번식했으며 포획 된 황새의 재 도입은 2005 년부터 시작되었습니다.

2020 년 현재 일본에는 200 마리 이상의 야생 황새가 서식합니다.